



Zyklogenie und Symbioselenkung – eine Buchneuerscheinung

Der bekannte Arzt Dr. med. Wolfgang Grüger, seit vielen Jahren erfahren in der SANUM-Therapie nach den Erkenntnissen von Professor Enderlein, hat im Verlag ebi-electronic ag, Kirchlindach (Schweiz), ein kleines, 67 Seiten umfassendes Bändchen mit dem Titel „Zyklogenie und Symbioselenkung“ erscheinen lassen. Mit Ausgang von den Anfangs- und Frühstadien ärztlichen

Denkens über den Monomorphismus der konservativen Mikrobiellehre bis hin zu dem Enderleinschen Pleomorphismus ist in dieser Schrift gut verständlich die Zyklogenie und Symbioselenkung nach den bereits vieltausendfach bestätigten Enderleinschen Forschungsergebnissen wiedergegeben. Der Autor hat hierbei nicht nur Wert auf die Darstellung von theoretischen Grundlagen zum

Thema gelegt, er hat auch Fragen der Praxis und Nutzenanwendung instruktiv behandelt. Für den neu sich interessierenden Leser stehen gerade diese Angaben im Vordergrund. Die Schrift „Zyklogenie und Symbioselenkung“ von Dr. med. Wolfgang Grüger ist auch vom Semmelweis-Verlag, 27316 Hoya, Telefon (04251) 504, zu beziehen und kostet 25 DM. □

ALBICANSAN®

ALBICANSAN® D5 Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1 ml enthält: 1 ml *Candida albicans* D5 aquos. dilut. (HAB 1, Vorschriften 5b, 11). **Art der Anwendung und Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet: 2mal wöchentlich 1 ml entweder intramuskulär oder intravenös injizieren. **Packungsgrößen:** 1 x 1 ml, 10 x 1 ml, 50 x 1 ml Ampullen.

ALBICANSAN® D5 Tropfen
Zusammensetzung: 10 ml flüssige Verdünnung enthalten: 10 ml *Candida albicans* D5 dil. (HAB 1, Vorschrift 5a). **Art der Anwendung und Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet: Zum Einnehmen: 1 mal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit. Zum Einreiben in die Haut: 2 mal wöchentlich 5–10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbogen. **Packungsgrößen:** 1 x 10 ml; 100 ml (10 x 10 ml) Tropfen.

ALBICANSAN® D3 Zäpfchen
Zusammensetzung: 1 Zäpfchen enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,2 g *Candida albicans* D3 dil. (HAB 1, Vorschrift 5a). Sonstiger Bestandteil: 1,8 g Hartfett. **Art der Anwendung und Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet: 1 x täglich vor dem Schlafengehen in den After einführen. **Packungsgrößen:** 1 x 10; 100 St. (10 x 10 St.) Zäpfchen.

ALBICANSAN® D3 Salbe
Zusammensetzung: 1 g Salbe enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil 0,14 g *Candida albicans* D3 dil. (HAB 1, Vorschrift 5a). Sonstiger Bestandteil: 0,2 g Miglyol 840-Gel, bestehend aus Propylenglycoldifettsäureester (C₆, C₁₂) [Miglyol 840] (Benzyl-dimethyl-octadecylammonium) = Lithium-magnesium-silicat, Propylencarbonat; 0,05 g Glycerol (mono, di, tri) [adipat, alkanooat (C₈, C₁₀), isostearat] (Softisan 649); 0,08 g dünnflüssiges Paraffin; 0,03 g Hartparaffin; 0,05 g Glycerolmonoisostearat; 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H₂O; 0,47 g Wasser für Injektionszwecke. **Art der Anwendung und Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet: 1–3 mal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien bzw. messerrückendick auf den Verband auftragen. **Packungsgrößen:** 1 x 30 g; 300 g (10 x 30 g) Salbe.

ALBICANSAN® D4 Kapseln
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 330 mg *Candida albicans* D4 trit. (HAB 1, Vorschriften 5a, 7). Sonstige Bestandteile: Kapselhülle, bestehend aus Gelatine, gereinigtem Wasser. **Art der Anwendung und Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet: täglich 1–3 Kapseln vor dem Frühstück oder abends vor dem Schlafengehen mit etwas Flüssigkeit einnehmen. **Packungsgrößen:** 1 x 20; 200 St. (10 x 20 St.) Kapseln.

Gegenanzeigen: Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden! **Dauer der Anwendung:** Keine zeitliche Begrenzung. Anwendungsdauer nach Anweisung des Verordners.

SANUM-KEHLBECK

**GmbH & Co. KG, Arzneimittelherstellung
D-27316 Hoya · Postfach 1355**