



Aus der Praxis für die Praxis

Angina - Halsweh – ein Darmleiden

von Dr. med. Konrad Werthmann

Die Angina oder schlicht ausgedrückt das Halsweh wird von den Patienten, aber auch von den Therapeuten meist auf die leichte Schulter genommen. Im Grunde ist es eine Erkrankung, die mehrere Tatsachen aufdeckt. Zunächst ist das örtliche Milieu überlastet, das bedeutet, dass der Patient die Ersatz-Abwehrorgane überfordert. Von wem?

Das primäre Abwehrorgan im gesamten Körper ist die Darmschleimhaut mit dem Bakterienrasen. Wird dieses Organ überlastet (oder ist nicht mehr vollständig einsatzbereit),

dann muss der Waldayer'sche Rachenring (die Lymphknoten in der Halsgegend) als Abwehrorgan 2. Klasse einspringen.

Ein weiteres Faktum ist die Elimination über die Entzündung (Reckeweg). Beide Tatsachen sprechen für die Rücksichtnahme auf die Darmschleimhaut und diese werden von den Therapeuten außer Acht gelassen. Man sieht nur die Entzündung, man glaubt, nur eine Immuntherapie ist notwendig und mehr nicht.

Die Erfahrung zeigt, dass man eine Angina, oder wie es verniedlichend

vom Laien ausgedrückt wird, das Halsweh, nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, denn sie hat einerseits eine Tendenz, über die Streptokokken als Fokus für andere Organe, vornehmlich für Herz, Niere oder Gelenke, zu dienen; andererseits besteht auch die Möglichkeit, sie relativ einfach zu behandeln. Die Streptokokken können nur wachsen, weil das Milieu ihnen zusagt (also Milieu-Änderung) und die Entzündung zeigt sich, weil die Hochvalenzen in der Penicillium-Zyklogenie überlastet sind. □

Dementsprechend einfach fällt die Rezeptur aus:

1. ALKALA N Pulver 2x ½ KL in warmem Wasser tgl. durch die gesamte Therapie. Kinder ab 6 Jahren 1x ¼ KL in warmem Wasser mit ein paar Tropfen Himbeersirup.
2. NOTAKEHL D5 Tr. 2x 8-10 tgl. (bzw. Tbl. 2x 1 tgl.) oder FORTAKEHL D5 Tr. 2x 8-10 tgl. durch 7-10 Tage, dann wechseln auf
3. SANKOMBI D5 Tr. 2x 8-10 tgl. Aber immer nach dem Schema: 5-2-5-2 verfahren (5 Tage SANKOMBI und dann 2 Tage NOTAKEHL (oder FORTAKEHL) und wieder 5 Tage SANKOMBI...)
4. SANUKEHL Strep D6 Tr. oder SANUKEHL Pseu D6 Tr. 1x 5 Tr. einreiben und/oder oral. Lassen Sie eine Kapsel REBAS D6 tgl. öffnen und den Inhalt auf die Mandelgegend geben.

Wichtig ist, dass man für 2-3 Wochen Kuhmilch-Produkte, evtl. auch Eierspeisen, meidet. Damit wird sich der Erfolg schneller einstellen.